

Preparo e administração da suspensão oral extemporânea (SOE) a partir do Fosfato de Oseltamivir 75mg (Tamiflu):

- ✓ Segurar uma cápsula de Fosfato de Oseltamivir 75mg sobre um recipiente de vidro limpo;
- ✓ Abrir a cápsula imediatamente antes do preparo cortando a ponta superior com uma tesoura limpa e verter cuidadosamente todo o conteúdo no fundo do recipiente de vidro;
- ✓ Utilizando uma seringa graduada, adicionar 5mL de água potável ao pó;
- ✓ Misturar o conteúdo com uma colher limpa durante dois minutos;
- ✓ A concentração da suspensão preparada, a partir da diluição da cápsula de 75mg do medicamento, é de 15mg/mL;
- ✓ Aspirar para a seringa a quantidade prescrita ao paciente, conforme Tabela;
- ✓ Não é necessário retirar qualquer pó branco não dissolvido, por se tratar de excipiente inerte.

Tabela 01: Equivalência entre dose prescrita em miligramas (mg) com o volume em mililitro (mL) da Suspensão Oral Extemporânea (SOE) conforme o peso corporal em quilograma (Kg):

Peso Corporal	Dose Prescrita	Volume (ml) da Solução Oral
≤ 15 Kg	30mg	2 ml
≥15 a 23 Kg	45mg	3 ml
23 a 40 Kg	60mg	4 ml
≥ 40Kg	75mg	5 ml