



PEP é uma Urgência. Indicada para pessoas expostas a situações de risco como: Sexo desprotegido, *Violência sexual e *Acidente de trabalho.

Unidade do Primeiro Atendimento



***PEP poderá ser indicada quando pessoa fonte teve exposição de risco nos últimos 30 dias, devido janela imunológica.*

QUANDO HOUVER INDICAÇÃO DE PEP



***** Em caso de acidente de trabalho repetir os TR em 30, 90 e 180 dias na UBS ou CTA (CEREDI).**

SEMPRE atentar para o tempo transcorrido entre a exposição e início da tomada das medicações; em caso de dúvida, prescrever e dispensar a medicação antes de liberar o paciente

***Notificação original deverá ser encaminhada ao DVE.**

Esquema de Medicções - Adulto

ESQUEMA PREFERENCIAL

(TDF + 3TC) + DTG

Tenofovir 300mg (TDF) + Lamivudina 300mg (3TC) (comprimido combinado) + Dolutegravir 50mg (DTG)

1 comprimido de cada, 1x ao dia por 28 dias. **(Início imediato).**

Crianças abaixo de 12 anos deverão ser encaminhadas ao Hospital Pequeno Anjo.

LINK FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO QR CODE AO LADO



<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEsn1EKsAWjC6Zw1FDE17fp3FfRyptVNXyCLTTbFH8ppEFJw/viewform>

Fonte: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais. Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: www.aids.gov.br
 Nota Informativa nº 1/2022 – CGAHV/DCCI/SVS/MS Dispõe sobre recomendações do uso de dolutegravir em gestantes independente da idade gestacional e mulheres vivendo com HIV em idade fértil, com intenção de engravidar.
 Fonte: Nota Técnica nº 197/2024 - CGHA/.DATHI/SVSA/MS. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2024/sei_0042701692_nota_tecnica_197-1.pdf/view

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
Sector IST/AIDS/HIV	Sector IST/AIDS/HIV e CEREDI	Sector IST/AIDS/HIV Diretoria da Vigilância Epidemiológica